

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

**Grupo Químico:** Molinato pertenece al grupo químico de los tiocarbamatos.

No comer, beber ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado en un lugar fresco y seco. Destine un equipo exclusivamente para aplicar herbicidas. Si no fuera posible, después de la aplicación lave bien el equipo antes de uso para productos afines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. Durante la aplicación usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y cuerpo. Aleje a los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento y no trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplicar directamente a corrientes o cursos de agua para evitar su contaminación. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica. Lavarse prolijamente con agua antes de comer, fumar o ir al baño, y después de cada jornada laboral.

**Síntomas de Intoxicación:** Sudoración, dolor de cabeza, taquicardia, debilidad general e hipotensión, náuseas, vómitos, diarreas, irritación de la piel y mucosas.

**Primeros Auxilios:** En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **contacto con la piel:** Retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelos, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. En caso de que la irritación persiste, consultar a un médico. En caso de **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si no respira, proporcionar respiración artificial. Llame a un médico. En caso de **Ingestión:** NO provocar el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llamar a un médico inmediatamente.

**Antídotos:** No se conoce antídoto específico.

**Tratamiento Médico de Emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de soporte.

**Ecotoxicidad:** MOLIROX presenta bajo riesgo para la microflora del suelo y lombrices de tierra, y especies de aguas templadas. No es tóxico para abejas, prácticamente no tóxico para aves. Tóxico para peces y organismos acuáticos.

**Instrucciones para el Triple Lavado:** Llenar ¼ del envase con agua y agitar en todos los sentidos, luego, vaciar esa agua en el estanque de aplicación para ser utilizada. Realizar la operación anterior 3 veces y posteriormente inutilizar los envases, perforándolos en su base.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE LA SALUD A CARGO.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

PARA APLICACIONES AÉREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

**Teléfono de Emergencia: Centro Toxicológico RITA – CHILE: 2 2777 1994 / 2 2661 9414**  
**Teléfono del Importador: Solchem SpA: 2 2334 9442**

**Precaución de Almacenaje:** Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo del producto. No almacenar con productos alimenticios, medicina, ropa o forraje.

**Nota al Comprador:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distinto a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje del contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

# MOLIROX

## HERBICIDA

### CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Herbicida selectivo para control de hualcacho en todas sus variedades, otras gramíneas y ciperáceas provenientes de semillas de arroz, las cuales se indican en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

**COMPOSICIÓN:**

Molinato\* .....74,77 % p/v (747,7 g/L)

Coformulantes, c.s.p. .... 100 % p/v (1 L)

\*Azepan-1-carbotioato de S-etilo

**Autorización Servicio Agrícola y Ganadero**  
**Nº 3.350**

Fabricado por:  
**SIPCAM OXON S.p.A**  
Via Sempione 195-  
20016 Pero,  
Milano, Italia

Importado por:  
**SOLCHEM SpA.**  
Don Carlos 2939 Of.608  
Las Condes, Santiago  
Chile.

**INFLAMABLE - NO CORROSIVO**  
**NO EXPLOSIVO**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA**  
**ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Lote:  
Vencimiento:  
Contenido Neto: Litros



**NOCIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO:**

MOLIROX es un herbicida selectivo para ser utilizado en siembras de arroz paddy, el cual actúa sobre la zona del cuello de las malezas, deteniendo su crecimiento y causando posteriormente su muerte. Controla todas las variedades de hualcacho, arroz rojo y otras gramíneas y ciperáceas provenientes de semillas.

**Cuadro de Instrucciones de uso para aplicaciones terrestres y aéreas:**

CULTIVO	MALEZA	DOSIS L/ha	OBSERVACIONES
Arroz	Hualcachos ( <i>Echinochloa colona</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-galli</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-pavonis</i> ).	5,0	Tratamiento de pre-siembra incorporado. Al ser un herbicida volátil debe incorporarse inmediatamente después de la aplicación. Incorporar con rastra de disco o de clavo liviana a una profundidad no superior a 9 cm. Emplear solo equipos terrestres, evitando los traslapes y consecuentes sobredosis que puedan dañar el cultivo. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 150 L/ha.
	Arroz rojo ( <i>Oryza sativa</i> ), Yerba lengüeta de flecha ( <i>Polypogon spp.</i> ), Torurco y Paja-pichi ( <i>Paspalum spp.</i> ).	9,0 a 10,5	Tratamiento de pre-siembra incorporado. Usar la dosis mayor para el control de arroz rojo. No sembrar antes de 4 días después de aplicado el producto. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 270 L/ha a 315 L/ha.
	Hualcachos ( <i>Echinochloa colona</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-galli</i> ) ( <i>Echinochloa cruz-pavonis</i> ), Junquillo, Pasto de agua, Quilmen ( <i>Eleocharis spp.</i> ), Sombrellita, Totora, Junco, Chufa ( <i>Scripus spp.</i> ).	5,5 a 6,0	Tratamiento de post-emergencia, post-inundación. Aplicar 10 a 15 días después de la siembra. Pulverizar por vía aérea* o manual después de inundar los cuarteles, aplicando directamente sobre la lámina de agua, de unos 5 a 10 cm, utilizando equipo pulverizador de espalda sin motor con barra tipo T con boquillas para herbicidas. El hualcacho debe tener 10 a 15 cm. de altura como máximo y estar sumergido por lo menos hasta las 2/3 partes de su tamaño al momento de aplicar. Se debe mantener el nivel del agua hasta que el hualcacho muera. Realizar una aplicación por temporada. Mojamiento para Aplicaciones Terrestres: 165 L/ha. Aplicar la dosis mayor en las aplicaciones aéreas.

(\*) En aplicaciones aéreas utilizar 60 L agua/ha.

**Preparación de la Mezcla:** MOLIROX se puede adicionar directamente al estanque a medio llenar de agua y completar al volumen requerido con agitación constante.

**Compatibilidad:** MOLIROX es compatible con herbicidas sulfonil ureas, atendándose a las restricciones de las etiquetas.

**Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de mezclas diferentes a las indicadas, consultar a nuestro Departamento Técnico.

**Fitotoxicidad:** MOLIROX sólo debe ser aplicado en arroz. Durante las aplicaciones evitar traslape para no aplicar sobredosis que pueda dañar al cultivo. No aplicar con vientos superiores a 4,8 km/hr ni en condiciones de lluvias y temperaturas extremas.

**Período de carencia:** No aplicable por el momento de la aplicación del herbicida.

**Tiempo de Reingreso:** No corresponde por las características del cultivo.

